

トウキに使用できる農薬一覧

【平成28年7月26日現在】

○留意事項(必ずお読みください)

- ①ここに掲載する農薬登録情報は、農林水産消費安全技術センターホームページの「農薬登録情報提供システム」を用いて検索により得られたデータを、当センターで表の順序を入れ換えるなどの改変を行ったものです。  
なお、掲載に関し、データの提供元である農林水産消費安全技術センターから事前に了解を得ています。
- ②実際の農薬使用にあたっては個々の農薬の登録内容をラベルで確認の上で使用してください。

○「農薬登録情報提供システム」での検索条件等

検索年月日: 平成28年7月26日  
 検索の種類: 作物名検索CSVダウンロード  
 検索方法: 「作物名称」欄に、絞込み操作により「とうき」を入力し、「用途」欄の「殺虫剤」「殺菌剤」「除草剤」のうち1つにチェックを入れて「ダウンロード」をクリック(用途別に3種の表をダウンロード)  
 ※絞込みは右記の分類で実施 野菜類 > その他野菜類 > とうき  
 ※検索画面の「用途」欄には、上記3種以外に「その他」も選択できるが、検索結果は「該当なし」であった。  
 検索結果の  
 改変事項: ①病害虫名称ごとに掲載するため、表の順序を入れ換え  
 ②下記項目以外を省略

○検索結果

《殺虫剤》

病害虫名称	農薬の種類	農薬の名称	希釈倍率	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
アブラムシ	アセタミプリド水溶剤	モスピラン顆粒水溶剤	2000倍	100～300 L/10a	発生初期	5回以内	散布
		日農モスピラン顆粒水溶剤					
		モスピラン水溶剤					
		日農モスピラン水溶剤					
キアゲハ	テブフェノジド水和剤	ロムダンフロアブル	3000倍	100～300 L/10a	発生初期	5回以内	散布
		日農ロムダンフロアブル					
		ホクコーロムダンフロアブル					
ハダニ類	クロルフェナピル水和剤	コテツフロアブル	2000倍	100～300 L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布
		クミアイコテツフロアブル					
		日曹コテツフロアブル					
		協友コテツフロアブル					

《殺菌剤》

雑草名称	農薬の種類	農薬の名称	希釈倍率	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
べと病	マンネブ水和剤	エムダイファー水和剤	600倍	100 L/10a	収穫14日前まで	4回以内	散布
		サンケイ					
		エムダイファー水和剤					

《除草剤》

雑草名称	農薬の種類	農薬の名称	希釈倍率 又は 使用量	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
一年生雑草	ペンディメタリン乳剤	ゴーゴーサン乳剤	300 ml/10a	100 L/10a	定植後(雑草発生前)但し、収穫120日前まで	1回	全面土壌散布
一年生雑草	リニュロン水和剤	丸和ロロックス	100 g/10a	70～150 L/10a	中耕・培土後但し、収穫120日前まで	2回以内	畦間土壌散布
		日農ロロックス					
		ホクサンロロックス					
		ロロックス					

○適用作物表※における分類

※平成13年10月10日付け13生産第3986号農林水産省生産局生産資材課長通知「農薬の登録申請に係る試験成績について」の運用についての別表1(1-1及び1-2)

トウキは、大グループ名「野菜類」、中グループ名「その他野菜類」の分類で、作物名「とうき」として掲載されている。  
作物名が「野菜類」で登録された農薬は、トウキにも使用可能