

9. 主要部位別の資料（平成24年）

（1）受診の動機

（H24年）

部位	国際分類	観察数	自覚症状	検診	その他
全部位	C00～C96, D00～D09	7,777 (100%)	27.5%	19.7%	52.8%
食道	C15	163 (100%)	31.3	17.2	51.5
胃	C16	1,390 (100%)	23.7	29.1	47.1
結腸	C18	726 (100%)	35.4	20.4	44.2
直腸	C19～C21	371 (100%)	32.9	18.6	48.5
肝臓	C22	255 (100%)	23.5	2.7	73.7
胆嚢・胆管	C23～C24	216 (100%)	28.7	4.2	67.1
膵臓	C25	272 (100%)	28.7	5.5	65.8
肺	C33～C34	859 (100%)	18.5	20.0	61.5
皮膚	C43～C44, C46	114 (100%)	46.5	0.0	53.5
乳房	C50, D05	628 (100%)	37.4	29.1	33.4
子宮	C53～58, D06	355 (100%)	27.6	28.7	43.7
卵巣	C56～C57	87 (100%)	31.0	5.7	63.2
前立腺	C61	479 (100%)	24.6	26.1	49.3
膀胱	C67	172 (100%)	50.0	4.7	45.3
腎臓・尿管	C64～C68	214 (100%)	19.2	11.2	69.6
脳	C71	64 (100%)	23.4	6.3	70.3
甲状腺	C73	143 (100%)	14.7	25.9	59.4
リンパ組織	C81～C90, C96	252 (100%)	27.4	8.7	63.9
白血病	C91～C95	47 (100%)	19.1	0.0	80.9

（2）病巣の広がり

（H24年）

部位	国際分類	観察数	早期 （上皮内）	当該臓器 限局	所属リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔 転移	不明
全部位	C00～C96, D00～D09	7,777 (100%)	11.4%	43.3%	8.8%	10.5%	16.2%	9.8%
食道	C15	163 (100%)	1.2	37.4	3.1	16.6	17.2	24.5
胃	C16	1,390 (100%)	4.2	57.3	10.1	6.0	15.9	6.4
結腸	C18	726 (100%)	0.8	48.5	17.8	10.1	18.2	4.7
直腸	C19～C21	371 (100%)	0.5	48.0	18.3	5.9	20.5	6.7
肝臓	C22	255 (100%)	0.0	62.4	2.4	9.8	9.4	16.1
胆嚢・胆管	C23～C24	216 (100%)	1.4	19.0	4.2	36.6	17.6	21.3
膵臓	C25	272 (100%)	0.0	9.6	3.3	33.8	41.9	11.4
肺	C33～C34	859 (100%)	0.1	34.3	10.6	8.1	37.0	9.8
皮膚	C43～C44, C46	114 (100%)	0.0	87.7	2.6	8.8	0.0	0.9
乳房	C50, D05	628 (100%)	15.3	50.8	21.5	3.5	2.9	6.1
子宮	C53～58, D06	355 (100%)	46.2	32.7	0.8	9.0	4.5	6.8
卵巣	C56～C57	87 (100%)	0.0	27.6	0.0	47.1	17.2	8.0
前立腺	C61	479 (100%)	0.0	60.1	1.3	11.5	14.8	12.3
膀胱	C67	172 (100%)	2.3	71.5	1.7	10.5	4.7	9.3
腎臓・尿管	C64～C68	214 (100%)	0.5	61.7	0.5	15.4	15.9	6.1
脳	C71	64 (100%)	0.0	60.9	0.0	18.8	3.1	17.2
甲状腺	C73	143 (100%)	0.0	43.4	39.2	8.4	4.2	4.9

(3) 診断方法

部位別の罹患件数に対する割合 (%)

(H24年)

部位	国際分類	画像診断	病理診断				その他
				細胞診	組織診	剖検	
全部位	C00～C96, D00～D09	79.1	69.0	25.1	61.2	0.0	51.4
食道	C15	82.8	73.1	2.7	73.1	0.0	60.8
胃	C16	84.3	86.4	7.4	86.2	0.0	57.6
結腸	C18	78.7	73.4	4.9	73.2	0.0	51.0
直腸	C19～C21	78.9	71.6	6.1	70.9	0.0	56.1
肝臓	C22	68.3	11.9	4.5	9.0	0.0	55.7
胆嚢・胆管	C23～C24	72.6	39.6	22.5	30.2	0.0	55.1
膵臓	C25	73.5	42.1	25.9	32.6	0.0	63.0
肺	C33～C34	81.9	64.2	56.4	51.6	0.0	71.5
乳房(女性)	C50, D05	91.2	87.4	25.6	78.7	0.0	60.7
乳房(男性)	C50, D05	100.0	100.0	33.3	100.0	0.0	50.0
子宮頸部	C53	87.3	90.5	85.7	79.4	0.0	71.4
子宮体部	C54	95.5	93.2	87.2	83.5	0.0	79.7
卵巣	C56～C57	86.0	71.0	67.0	41.0	0.0	79.0
前立腺	C61	85.2	78.2	4.7	77.0	0.0	64.5
膀胱	C67	81.6	76.6	69.2	44.8	0.0	18.4
腎臓・尿管	C64～C66, C68	87.1	41.7	30.8	20.4	0.0	18.3
脳	C71	70.1	32.2	6.9	27.6	0.0	8.0
甲状腺	C73	89.6	83.8	77.3	32.5	0.0	18.2

(4) 治療方法

部位別の罹患件数に対する割合 (%)

(H24年)

部位	国際分類	手術	放射線	化学療法	その他
全部位	C00～C96, D00～D09	65.1	11.3	31.3	17.6
食道	C15	51.8	31.1	47.0	18.9
胃	C16	78.7	0.3	21.8	11.2
結腸	C18	89.6	0.1	28.4	7.8
直腸	C19～C21	88.2	3.2	35.0	8.0
肝	C22	25.0	1.6	36.3	44.1
胆嚢・胆管	C23～C24	51.4	7.4	26.9	34.3
膵	C25	39.7	5.1	61.8	24.6
肺	C33～C34	40.9	18.7	39.6	26.6
乳房(女性)	C50, D05	91.0	41.4	41.9	8.3
乳房(男性)	C50, D05	100.0	16.7	50.0	0.0
子宮頸部	C53	64.9	49.1	38.6	12.3
子宮体部	C54	91.4	3.1	47.7	6.3
卵巣	C56～C57	83.9	0.0	75.9	8.0
前立腺	C61	21.7	22.6	21.7	42.7
膀胱	C67	83.2	13.9	29.5	10.4
腎・尿管	C64～C66, C68	71.0	4.7	13.1	17.8
脳	C71	56.9	38.5	29.2	35.4
甲状腺	C73	88.8	11.2	2.8	9.8

(5) 年齢階級別罹患数

表 主要部位の年齢階級別罹患数・男（H24年）

年齢	全部位	口腔咽頭	口唇	舌	大唾液腺	歯肉	口腔底	その他	中咽頭	鼻(上)
	口腔								咽頭	
	C00～C96	C00～C14	C00	C01～C02	C07～C08	C03	C04	C05～C06	C09～C10	C11
総数	5,186	89	2	21	5	7	3	4	11	6
0～4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5～9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10～14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15～19	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20～24	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25～29	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30～34	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	36	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40～44	53	2	0	1	0	0	0	0	0	1
45～49	87	3	0	1	0	0	0	0	1	1
50～54	164	3	0	2	0	0	0	0	0	0
55～59	272	11	0	4	1	0	0	0	0	1
60～64	679	11	1	3	0	1	1	0	2	2
65～69	757	20	0	3	2	1	1	0	4	0
70～74	836	16	0	4	2	3	0	3	2	0
75～79	914	9	1	0	0	0	0	1	0	1
80～84	746	9	0	1	0	2	1	0	0	0
85～	596	4	0	1	0	0	0	0	2	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 主要部位の年齢階級別罹患数・女（H24年）

年齢	全部位	口腔咽頭	口唇	舌	大唾液腺	歯肉	口腔底	その他	中咽頭	鼻(上)
	口腔								咽頭	
	C00～C96	C00～C14	C00	C01～C02	C07～C08	C03	C04	C05～C06	C09～C10	C11
総数	3,944	51	0	14	3	18	2	3	3	2
0～4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5～9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10～14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15～19	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20～24	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25～29	42	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30～34	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	94	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40～44	131	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45～49	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	186	6	0	1	0	1	1	0	1	0
55～59	235	6	0	2	0	2	0	0	1	0
60～64	394	2	0	2	0	0	0	0	0	0
65～69	430	5	0	0	0	3	0	1	0	0
70～74	467	3	0	0	0	2	0	0	0	0
75～79	485	5	0	1	0	2	0	0	0	1
80～84	522	9	0	4	1	3	1	0	0	0
85～	711	12	0	1	2	5	0	2	1	1
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 主要部位の年齢階級別罹患数・男（H24年）

年齢	下咽頭	部位不明	食道	胃	小腸	結腸	直腸・	肝・	胆嚢・	膵
	口腔						肛門	肝内胆管	肝外胆管	
	C12~C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19~C21	C22	C23~C24	C25
総数	22	8	159	1,026	22	448	262	255	135	207
0~4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5~9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10~14	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
15~19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20~24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25~29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30~34	0	0	0	3	0	2	2	0	0	0
35~39	0	0	0	1	1	1	2	2	0	0
40~44	0	0	1	5	1	4	3	3	0	0
45~49	0	0	1	10	0	8	5	2	0	4
50~54	1	0	5	26	0	16	17	7	1	6
55~59	4	1	9	62	2	14	17	18	1	11
60~64	1	0	31	157	0	60	48	33	11	30
65~69	7	2	26	163	3	63	52	33	14	29
70~74	1	1	30	193	7	69	37	41	13	34
75~79	4	2	25	159	3	90	32	46	40	36
80~84	3	2	15	131	1	61	29	41	27	30
85~	1	0	16	116	4	59	18	29	28	27
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 主要部位の年齢階級別罹患数・女（H24年）

年齢	下咽頭	部位不明	食道	胃	小腸	結腸	直腸・	肝・	胆嚢・	膵
	口腔						肛門	肝内胆管	肝外胆管	
	C12~C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19~C21	C22	C23~C24	C25
総数	6	0	27	517	7	391	164	124	150	152
0~4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5~9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10~14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15~19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
20~24	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
25~29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30~34	0	0	0	3	0	2	0	0	0	1
35~39	0	0	0	6	0	3	1	0	1	0
40~44	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0
45~49	0	0	1	8	0	4	5	1	3	3
50~54	2	0	0	10	0	8	10	1	2	3
55~59	1	0	2	25	0	13	6	3	2	7
60~64	0	0	3	42	0	28	15	5	7	11
65~69	1	0	4	56	2	51	21	11	12	19
70~74	1	0	2	71	2	46	23	16	12	16
75~79	1	0	5	84	1	67	17	27	22	24
80~84	0	0	5	96	1	64	28	27	21	29
85~	0	0	5	114	1	103	38	33	68	38
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 主要部位の年齢階級別罹患数・男（H24年）

年齢	後腹膜・	部位不明	鼻腔・中耳	喉頭	気管支・	胸膜	胸腺・心	部位不明	骨・	結合組織
	腹膜	消化器	副鼻腔		肺		縦隔・胸膜	胸腔内臓器	関節軟骨	軟部組織
	C48	C26	C30～C31	C32	C33～C34	C45	C37～C38	C39	C40～C41	C47, C49
総数	4	2	11	51	705	9	11	0	7	12
0～4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5～9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10～14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
15～19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20～24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25～29	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
30～34	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
35～39	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
40～44	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	1	13	0	0	0	0	0
50～54	0	0	2	1	16	0	0	0	1	1
55～59	1	0	1	2	25	1	3	0	0	1
60～64	0	0	1	9	85	2	0	0	3	1
65～69	0	0	0	8	101	2	1	0	0	1
70～74	0	1	0	6	108	1	3	0	0	0
75～79	1	1	2	12	136	1	2	0	0	3
80～84	0	0	3	4	121	2	1	0	2	1
85～	1	0	0	5	93	0	1	0	0	3
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 主要部位の年齢階級別罹患数・女（H24年）

年齢	後腹膜・	部位不明	鼻腔・中耳	喉頭	気管支・	胸膜	胸腺・心	部位不明	骨・	結合組織
	腹膜	消化器	副鼻腔		肺		縦隔・胸膜	胸腔内臓器	関節軟骨	軟部組織
	C48	C26	C30～C31	C32	C33～C34	C45	C37～C38	C39	C40～C41	C47, C49
総数	7	1	6	2	329	3	4	0	8	7
0～4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5～9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10～14	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
15～19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20～24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25～29	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
30～34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
45～49	0	0	0	0	6	0	0	0	1	0
50～54	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	10	0	1	0	0	1
60～64	1	0	0	0	29	0	1	0	0	0
65～69	1	0	1	0	41	0	0	0	0	1
70～74	1	1	0	1	52	0	0	0	1	2
75～79	2	0	0	0	39	1	2	0	0	1
80～84	1	0	1	1	63	2	0	0	2	1
85～	0	0	4	0	80	0	0	0	2	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 主要部位の年齢階級別罹患数・男（H24年）

年齢	悪性	その他	乳房	前立腺	睪丸	陰茎
	黒色腫	皮膚	(上皮内含む)			その他男性性器
	C43	C44, C46	C50, D05	C61	C62	C60, C63
総数	4	57	6	527	17	7
0～4	0	0	0	0	0	0
5～9	0	0	0	0	0	0
10～14	0	0	0	0	0	0
15～19	0	0	0	0	0	0
20～24	0	0	0	0	0	0
25～29	0	0	0	0	2	0
30～34	0	1	0	0	2	0
35～39	0	2	0	0	1	0
40～44	0	0	0	0	4	0
45～49	1	0	0	0	1	0
50～54	1	6	0	4	3	0
55～59	0	1	0	23	1	0
60～64	0	1	1	51	1	1
65～69	1	8	1	97	1	1
70～74	0	9	2	101	0	2
75～79	0	8	1	107	1	1
80～84	0	10	0	87	0	0
85～	1	11	1	57	0	2
不詳	0	0	0	0	0	0

表 主要部位の年齢階級別罹患数・女（H24年）

年齢	悪性	その他	乳房	子宮	子宮	子宮頸部	胎盤	子宮体部	卵巣	外陰・膣
	黒色腫	皮膚	(上皮内含む)		部位不明					その他女性性器
	C43	C44, C46	C50, D05	C53～55, C58	C55	C53	C58	C54	C56～C57	C51, C52
総数	7	52	661	202	6	63	0	133	100	13
0～4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5～9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10～14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
15～19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20～24	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
25～29	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0
30～34	0	0	7	6	0	5	0	1	2	0
35～39	1	0	29	8	0	4	0	4	1	0
40～44	0	0	45	17	0	9	0	8	9	0
45～49	0	0	57	13	0	6	0	7	9	0
50～54	0	2	65	23	0	2	0	21	7	1
55～59	0	1	64	32	0	5	0	27	13	0
60～64	1	5	98	25	1	8	0	16	15	1
65～69	0	4	78	20	0	4	0	16	12	2
70～74	1	4	79	17	1	5	0	11	7	0
75～79	2	6	57	11	1	1	0	9	8	2
80～84	1	11	35	17	1	7	0	9	7	3
85～	1	19	45	12	2	6	0	4	8	4
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 主要部位の年齢階級別罹患数・男（H24年）

年齢	膀胱	腎・尿管	眼・	脳	髄膜・	甲状腺	副腎・	その他	リンパ節	呼吸消化器
	付属器			その他神経系		その他内分泌腺		部位不明確	続発性	続発性
	C67	C64~66, C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74~C75	C76	C77	C78
総数	153	154	2	47	16	38	13	0	0	6
0~4	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0
5~9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10~14	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0
15~19	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
20~24	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
25~29	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
30~34	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
35~39	0	4	0	3	3	3	0	0	0	0
40~44	0	4	0	0	0	5	1	0	0	0
45~49	3	9	0	4	0	4	0	0	0	0
50~54	3	9	0	3	1	3	0	0	0	0
55~59	10	11	0	1	0	4	0	0	0	0
60~64	11	13	1	5	1	3	2	0	0	0
65~69	20	20	0	5	0	5	0	0	0	0
70~74	21	19	0	8	2	3	4	0	0	2
75~79	31	29	0	6	1	4	0	0	0	0
80~84	26	25	0	4	3	2	1	0	0	1
85~	28	11	1	3	4	0	0	0	0	3
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 主要部位の年齢階級別罹患数・女（H24年）

年齢	膀胱	腎・尿管	眼・	脳	髄膜・	甲状腺	副腎・	その他	リンパ節	呼吸消化器
	付属器			その他神経系		その他内分泌腺		部位不明確	続発性	続発性
	C67	C64~66, C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74~C75	C76	C77	C78
総数	48	86	0	39	44	116	23	6	0	3
0~4	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
5~9	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
10~14	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
15~19	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
20~24	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0
25~29	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0
30~34	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0
35~39	0	0	0	1	0	5	3	0	0	0
40~44	0	2	0	4	2	6	2	0	0	0
45~49	0	3	0	0	2	8	2	0	0	0
50~54	1	2	0	0	5	11	0	1	0	0
55~59	1	4	0	1	4	9	2	0	0	0
60~64	6	14	0	4	6	17	2	0	0	0
65~69	3	11	0	5	2	19	2	0	0	0
70~74	6	8	0	6	10	13	2	0	0	0
75~79	11	16	0	1	4	11	0	1	0	0
80~84	5	15	0	9	5	3	0	1	0	0
85~	15	11	0	2	4	5	0	3	0	3
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 主要部位の年齢階級別罹患数・男（H24年）

年齢	その他	原発部位	リンパ組織	リンパ肉腫	ホジキン病	リンパ様・	多発性	白血病	リンパ性	骨髄性
	続発性	不明		細網肉腫		組織球他	骨髄腫		白血病	白血病
	C79	C80	C81~C90, C96	C83, C85	C81	C82, C84, C96	C88, C90	C91~C95	C91	C92
総数	5	37	219	142	7	36	34	69	9	50
0~4	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
5~9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10~14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15~19	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0
20~24	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0
25~29	0	0	0	0	0	0	0	5	1	4
30~34	0	0	1	0	0	1	0	2	1	1
35~39	0	0	3	1	1	0	1	3	0	2
40~44	0	0	6	3	0	3	0	0	0	0
45~49	0	1	3	2	1	0	0	1	0	1
50~54	0	2	11	6	1	4	0	4	0	3
55~59	0	2	14	10	0	4	0	3	1	1
60~64	1	5	32	22	0	7	3	8	1	6
65~69	2	2	19	9	0	6	4	8	0	8
70~74	0	3	16	7	1	5	3	10	0	8
75~79	0	3	45	31	1	4	9	11	1	9
80~84	1	12	34	23	1	1	9	7	0	6
85~	1	7	32	26	0	1	5	3	0	1
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 主要部位の年齢階級別罹患数・女（H24年）

年齢	その他	原発部位	リンパ組織	リンパ肉腫	ホジキン病	リンパ様・	多発性	白血病	リンパ性	骨髄性
	続発性	不明		細網肉腫		組織球他	骨髄腫		白血病	白血病
	C79	C80	C81~C90, C96	C83, C85	C81	C82, C84, C96	C88, C90	C91~C95	C91	C92
総数	7	27	185	102	4	31	48	46	14	26
0~4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5~9	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1
10~14	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
15~19	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
20~24	0	0	2	1	1	0	0	1	1	0
25~29	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0
30~34	0	0	1	1	0	0	0	2	1	1
35~39	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
40~44	0	0	2	1	0	1	0	1	0	1
45~49	0	0	2	2	0	0	0	1	1	0
50~54	0	2	3	0	0	2	1	0	0	0
55~59	0	0	11	5	0	1	5	1	0	0
60~64	0	3	26	11	1	8	6	6	1	5
65~69	1	1	17	9	0	4	4	3	1	2
70~74	0	3	26	15	0	3	8	6	2	1
75~79	1	2	26	13	0	5	8	3	0	2
80~84	2	4	28	19	1	1	7	6	1	5
85~	3	12	36	22	0	5	9	13	4	8
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 主要部位の年齢階級別罹患数・男（H24年）

年齢	単球性	その他	形態不明	消化器	呼吸系	皮膚	その他
	白血病	白血病	白血病	上皮内癌	上皮内癌	上皮内癌	上皮内癌
	C93	C94	C95	D00～D01	D02	D03～D04	D09
総数	1	3	6	231	8	20	135
0～4	0	0	0	0	0	0	0
5～9	0	0	0	0	0	0	0
10～14	0	0	0	0	0	0	0
15～19	0	0	0	0	0	0	0
20～24	0	0	0	0	0	0	0
25～29	0	0	0	0	0	0	0
30～34	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	1	3	0	0	0
40～44	0	0	0	5	0	0	2
45～49	0	0	0	12	0	0	1
50～54	1	0	0	10	0	0	2
55～59	0	1	0	14	0	0	9
60～64	0	1	0	42	1	0	17
65～69	0	0	0	29	5	1	16
70～74	0	1	1	45	0	3	27
75～79	0	0	1	41	0	6	21
80～84	0	0	1	25	1	5	24
85～	0	0	2	5	1	5	16
不詳	0	0	0	0	0	0	0

表 主要部位の年齢階級別罹患数・女（H24年）

年齢	単球性	その他	形態不明	消化器	呼吸系	皮膚	子宮頸部	その他
	白血病	白血病	白血病	上皮内癌	上皮内癌	上皮内癌	上皮内癌	上皮内癌
	C93	C94	C95	D00～D01	D02	D03～D04	D06	D09
総数	1	3	2	113	5	20	169	22
0～4	0	0	0	0	0	0	0	0
5～9	0	0	0	0	0	0	0	0
10～14	0	0	0	0	0	0	0	0
15～19	0	0	0	0	0	0	0	0
20～24	0	0	0	0	0	0	7	0
25～29	0	0	0	0	0	0	26	0
30～34	0	0	0	0	1	0	32	0
35～39	0	0	0	1	0	0	32	0
40～44	0	0	0	7	0	0	28	0
45～49	0	0	0	3	0	0	22	0
50～54	0	0	0	7	1	0	7	1
55～59	1	0	0	12	0	0	2	2
60～64	0	0	0	11	0	1	8	1
65～69	0	0	0	18	1	1	2	3
70～74	0	3	0	21	0	3	2	4
75～79	0	0	1	15	2	4	0	5
80～84	0	0	0	12	0	3	0	4
85～	0	0	1	6	0	8	1	2
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0

(6) 性・年齢階級別罹患率

表 主要部位の年齢階級別罹患率・男 (H24年)

年齢	全部位	口腔咽頭	口唇	舌	大唾液腺	歯肉	口腔底	その他	中咽頭	鼻(上)
	C00～C96						口腔		咽頭	
	D00～D09	C00～C14	C00	C01～C02	C07～C08	C03	C04	C05～C06	C09～C10	C11
0～4	29.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5～9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10～14	19.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15～19	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20～24	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25～29	47.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30～34	59.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35～39	100.4	2.8	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40～44	127.5	4.8	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
45～49	258.6	8.9	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
50～54	527.5	9.6	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55～59	866.7	35.1	0.0	12.7	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2
60～64	1768.7	28.7	2.6	7.8	0.0	2.6	2.6	0.0	5.2	5.2
65～69	1783.9	47.1	0.0	7.1	4.7	2.4	2.4	0.0	9.4	0.0
70～74	2492.0	47.7	0.0	11.9	6.0	8.9	0.0	8.9	6.0	0.0
75～79	3815.5	37.6	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	4.2
80～84	4009.0	48.4	0.0	5.4	0.0	10.7	5.4	0.0	0.0	0.0
85～	4034.4	27.1	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0
粗罹患率	1004.7	17.2	0.4	4.1	1.0	1.4	0.6	0.8	2.1	1.2
年齢調整罹患率										
S60年モデル人口	501.8	9.7	0.2	2.8	0.5	0.6	0.3	0.3	1.1	0.9
世界人口	357.9	7.1	0.1	2.1	0.4	0.4	0.2	0.2	0.9	0.7

表 主要部位の年齢階級別罹患率・女 (H24年)

年齢	全部位	口腔咽頭	口唇	舌	大唾液腺	歯肉	口腔底	その他	中咽頭	鼻(上)
	C00～C96						口腔		咽頭	
	D00～D09	C00～C14	C00	C01～C02	C07～C08	C03	C04	C05～C06	C09～C10	C11
0～4	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5～9	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10～14	20.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15～19	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20～24	83.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25～29	197.2	4.7	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30～34	231.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35～39	277.9	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40～44	331.5	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45～49	460.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50～54	592.9	19.1	0.0	3.2	0.0	3.2	3.2	0.0	3.2	0.0
55～59	713.6	18.2	0.0	6.1	0.0	6.1	0.0	0.0	3.0	0.0
60～64	971.2	4.9	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65～69	950.0	11.0	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0	2.2	0.0	0.0
70～74	1199.5	7.7	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0
75～79	1501.9	15.5	0.0	3.1	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	3.1
80～84	1727.8	29.8	0.0	13.2	3.3	9.9	3.3	0.0	0.0	0.0
85～	2179.6	36.8	0.0	3.1	6.1	15.3	0.0	6.1	3.1	3.1
粗罹患率	717.6	9.3	0.0	2.5	0.5	3.3	0.4	0.5	0.5	0.4
年齢調整罹患率										
S60年モデル人口	380.2	4.8	0.0	1.8	0.1	1.3	0.2	0.1	0.4	0.1
世界人口	291.4	3.6	0.0	1.4	0.0	0.9	0.2	0.1	0.3	0.0

表 主要部位の年齢階級別罹患率・男（H24年）

年齢	下咽頭	部位不明	食道	胃	小腸	結腸	直腸・	肝・	胆嚢・	膝
	口腔						肛門	肝内胆管	肝外胆管	
	C12~C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19~C21	C22	C23~C24	C25
0~4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5~9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10~14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0
15~19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20~24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25~29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30~34	0.0	0.0	0.0	10.6	0.0	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0
35~39	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8	2.8	5.6	5.6	0.0	0.0
40~44	0.0	0.0	2.4	12.0	2.4	9.6	7.2	7.2	0.0	0.0
45~49	0.0	0.0	3.0	29.7	0.0	23.8	14.9	5.9	0.0	11.9
50~54	3.2	0.0	16.1	83.6	0.0	51.5	54.7	22.5	3.2	19.3
55~59	12.7	3.2	28.7	197.6	6.4	44.6	54.2	57.4	3.2	35.1
60~64	2.6	0.0	80.8	409.0	0.0	156.3	125.0	86.0	28.7	78.1
65~69	16.5	4.7	61.3	384.1	7.1	148.5	122.5	77.8	33.0	68.3
70~74	3.0	3.0	89.4	575.3	20.9	205.7	110.3	122.2	38.8	101.3
75~79	16.7	8.3	104.4	663.7	12.5	375.7	133.6	192.0	167.0	150.3
80~84	16.1	10.7	80.6	704.0	5.4	327.8	155.8	220.3	145.1	161.2
85~	6.8	0.0	108.3	785.2	27.1	399.4	121.8	196.3	189.5	182.8
粗罹患率	4.3	1.5	30.8	198.8	4.3	86.8	50.8	49.4	26.2	40.1
年齢調整罹患率										
S60年モデル人口	2.3	0.7	15.4	96.9	2.1	42.0	27.9	24.1	10.4	19.2
世界人口	1.6	0.5	11.1	68.9	1.5	29.5	20.6	16.8	6.5	13.5

表 主要部位の年齢階級別罹患率・女（H24年）

年齢	下咽頭	部位不明	食道	胃	小腸	結腸	直腸・	肝・	胆嚢・	膝
	口腔						肛門	肝内胆管	肝外胆管	
	C12~C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19~C21	C22	C23~C24	C25
0~4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5~9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10~14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15~19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
20~24	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25~29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30~34	0.0	0.0	0.0	11.4	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0	3.8
35~39	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	8.9	3.0	0.0	3.0	0.0
40~44	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0
45~49	0.0	0.0	3.0	23.9	0.0	12.0	15.0	3.0	9.0	9.0
50~54	6.4	0.0	0.0	31.9	0.0	25.5	31.9	3.2	6.4	9.6
55~59	3.0	0.0	6.1	75.9	0.0	39.5	18.2	9.1	6.1	21.3
60~64	0.0	0.0	7.4	103.5	0.0	69.0	37.0	12.3	17.3	27.1
65~69	2.2	0.0	8.8	123.7	4.4	112.7	46.4	24.3	26.5	42.0
70~74	2.6	0.0	5.1	182.4	5.1	118.2	59.1	41.1	30.8	41.1
75~79	3.1	0.0	15.5	260.1	3.1	207.5	52.6	83.6	68.1	74.3
80~84	0.0	0.0	16.6	317.8	3.3	211.8	92.7	89.4	69.5	96.0
85~	0.0	0.0	15.3	349.5	3.1	315.7	116.5	101.2	208.5	116.5
粗罹患率	1.1	0.0	4.9	94.1	1.3	71.1	29.8	22.6	27.3	27.7
年齢調整罹患率										
S60年モデル人口	0.8	0.0	2.0	36.6	0.4	25.9	12.4	7.0	7.8	10.4
世界人口	0.6	0.0	1.4	25.8	0.3	18.1	9.0	4.5	5.5	7.4

表 主要部位の年齢階級別罹患率・男（H24年）

年齢	後腹膜・	部位不明	鼻腔・中耳	喉頭	気管支・	胸膜	胸腺・心	部位不明	骨・	結合組織
	腹膜	消化器	副鼻腔		肺		縦隔・胸膜	胸腔内臓器	関節軟骨	軟部組織
	C48	C26	C30~C31	C32	C33~C34	C45	C37~C38	C39	C40~C41	C47, C49
0~4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5~9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10~14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0
15~19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20~24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25~29	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30~34	0.0	0.0	3.5	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35~39	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
40~44	0.0	0.0	0.0	4.8	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45~49	0.0	0.0	0.0	3.0	38.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50~54	0.0	0.0	6.4	3.2	51.5	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2
55~59	3.2	0.0	3.2	6.4	79.7	3.2	9.6	0.0	0.0	3.2
60~64	0.0	0.0	2.6	23.4	221.4	5.2	0.0	0.0	7.8	2.6
65~69	0.0	0.0	0.0	18.9	238.0	4.7	2.4	0.0	0.0	2.4
70~74	0.0	3.0	0.0	17.9	321.9	3.0	8.9	0.0	0.0	0.0
75~79	4.2	4.2	8.3	50.1	567.7	4.2	8.3	0.0	0.0	12.5
80~84	0.0	0.0	16.1	21.5	650.3	10.7	5.4	0.0	10.7	5.4
85~	6.8	0.0	0.0	33.8	629.5	0.0	6.8	0.0	0.0	20.3
粗罹患率	0.8	0.4	2.1	9.9	136.6	1.7	2.1	0.0	1.4	2.3
年齢調整罹患率										
S60年モデル人口	0.5	0.2	1.7	5.2	63.5	0.9	1.1	0.0	1.0	1.3
世界人口	0.4	0.1	1.3	3.7	43.7	0.6	0.8	0.0	0.9	0.9

表 主要部位の年齢階級別罹患率・女（H24年）

年齢	後腹膜・	部位不明	鼻腔・中耳	喉頭	気管支・	胸膜	胸腺・心	部位不明	骨・	結合組織
	腹膜	消化器	副鼻腔		肺		縦隔・胸膜	胸腔内臓器	関節軟骨	軟部組織
	C48	C26	C30~C31	C32	C33~C34	C45	C37~C38	C39	C40~C41	C47, C49
0~4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5~9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10~14	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0
15~19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20~24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25~29	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0
30~34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35~39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40~44	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
45~49	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
50~54	3.2	0.0	0.0	0.0	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55~59	0.0	0.0	0.0	0.0	30.4	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0
60~64	2.5	0.0	0.0	0.0	71.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
65~69	2.2	0.0	2.2	0.0	90.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
70~74	2.6	2.6	0.0	2.6	133.6	0.0	0.0	0.0	2.6	5.1
75~79	6.2	0.0	0.0	0.0	120.8	3.1	6.2	0.0	0.0	3.1
80~84	3.3	0.0	3.3	3.3	208.5	6.6	0.0	0.0	6.6	3.3
85~	0.0	0.0	12.3	0.0	245.2	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0
粗罹患率	1.3	0.2	1.1	0.4	59.9	0.5	0.7	0.0	1.5	1.3
年齢調整罹患率										
S60年モデル人口	0.6	0.1	0.2	0.1	22.0	0.1	0.4	0.0	1.1	0.7
世界人口	0.5	0.1	0.1	0.1	15.9	0.1	0.3	0.0	1.0	0.5

表 主要部位の年齢階級別罹患率・男（H24年）

年齢	悪性	その他	乳房	前立腺	睾丸	陰茎
	黒色腫	皮膚	(上皮内含む)			その他男性性器
	C43	C44, C46	C50, D05	C61	C62	C60, C63
0～4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5～9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10～14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15～19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20～24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25～29	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	0.0
30～34	0.0	3.5	0.0	0.0	7.0	0.0
35～39	0.0	5.6	0.0	0.0	2.8	0.0
40～44	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0
45～49	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
50～54	3.2	19.3	0.0	12.9	9.6	0.0
55～59	0.0	3.2	0.0	73.3	3.2	0.0
60～64	0.0	2.6	2.6	132.8	2.6	2.6
65～69	2.4	18.9	2.4	228.6	2.4	2.4
70～74	0.0	26.8	6.0	301.1	0.0	6.0
75～79	0.0	33.4	4.2	446.7	4.2	4.2
80～84	0.0	53.7	0.0	467.5	0.0	0.0
85～	6.8	74.5	6.8	385.8	0.0	13.5
粗罹患率	0.8	11.0	1.2	102.1	3.3	1.4
年齢調整罹患率						
S60年モデル人口	0.5	5.5	0.5	45.3	3.4	0.6
世界人口	0.4	3.8	0.4	30.5	2.9	0.4

表 主要部位の年齢階級別罹患率・女（H24年）

年齢	悪性	その他	乳房	子宮	子宮	子宮頸部	胎盤	子宮体部	卵巣	外陰・膣
	黒色腫	皮膚	(上皮内含む)		部位不明					その他女性性器
	C43	C44, C46	C50, D05	C53～55, C58	C55	C53	C58	C54	C56～C57	C51, C52
0～4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5～9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10～14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0
15～19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20～24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0
25～29	0.0	0.0	9.4	4.7	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0
30～34	0.0	0.0	26.6	22.8	0.0	19.0	0.0	3.8	7.6	0.0
35～39	3.0	0.0	85.7	23.7	0.0	11.8	0.0	11.8	3.0	0.0
40～44	0.0	0.0	113.9	43.0	0.0	22.8	0.0	20.2	22.8	0.0
45～49	0.0	0.0	170.4	38.9	0.0	17.9	0.0	20.9	26.9	0.0
50～54	0.0	6.4	207.2	73.3	0.0	6.4	0.0	66.9	22.3	3.2
55～59	0.0	3.0	194.3	97.2	0.0	15.2	0.0	82.0	39.5	0.0
60～64	2.5	12.3	241.6	61.6	2.5	19.7	0.0	39.4	37.0	2.5
65～69	0.0	8.8	172.3	44.2	0.0	8.8	0.0	35.3	26.5	4.4
70～74	2.6	10.3	202.9	43.7	2.6	12.8	0.0	28.3	18.0	0.0
75～79	6.2	18.6	176.5	34.1	3.1	3.1	0.0	27.9	24.8	6.2
80～84	3.3	36.4	115.9	56.3	3.3	23.2	0.0	29.8	23.2	9.9
85～	3.1	58.2	137.9	36.8	6.1	18.4	0.0	12.3	24.5	12.3
粗罹患率	1.3	9.5	120.3	36.8	1.1	11.5	0.0	24.2	18.2	2.4
年齢調整罹患率										
S60年モデル人口	0.6	2.9	83.5	27.4	0.3	9.1	0.0	18.0	12.9	0.8
世界人口	0.4	2.1	64.6	21.1	0.2	7.1	0.0	13.7	10.2	0.6

表 主要部位の年齢階級別罹患率・男（H24年）

年齢	膀胱	腎・尿管	眼・	脳	髄膜・	甲状腺	副腎・	その他	リンパ節	呼吸消化器
	付属器			その他神経系		その他内分泌腺		部位不明確	続発性	続発性
	C67	C64～66, C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74～C75	C76	C77	C78
0～4	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0
5～9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10～14	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0
15～19	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20～24	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25～29	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0
30～34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0
35～39	0.0	11.2	0.0	8.4	8.4	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0
40～44	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0	12.0	2.4	0.0	0.0	0.0
45～49	8.9	26.8	0.0	11.9	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0
50～54	9.6	28.9	0.0	9.6	3.2	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0
55～59	31.9	35.1	0.0	3.2	0.0	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0
60～64	28.7	33.9	2.6	13.0	2.6	7.8	5.2	0.0	0.0	0.0
65～69	47.1	47.1	0.0	11.8	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0
70～74	62.6	56.6	0.0	23.8	6.0	8.9	11.9	0.0	0.0	6.0
75～79	129.4	121.1	0.0	25.0	4.2	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0
80～84	139.7	134.4	0.0	21.5	16.1	10.7	5.4	0.0	0.0	5.4
85～	189.5	74.5	6.8	20.3	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3
粗罹患率	29.6	29.8	0.4	9.1	3.1	7.4	2.5	0.0	0.0	1.2
年齢調整罹患率										
S60年モデル人口	13.4	16.8	0.2	6.4	1.9	5.9	2.4	0.0	0.0	0.4
世界人口	9.0	11.9	0.1	5.6	1.5	4.6	2.8	0.0	0.0	0.2

表 主要部位の年齢階級別罹患率・女（H24年）

年齢	膀胱	腎・尿管	眼・	脳	髄膜・	甲状腺	副腎・	その他	リンパ節	呼吸消化器
	付属器			その他神経系		その他内分泌腺		部位不明確	続発性	続発性
	C67	C64～66, C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74～C75	C76	C77	C78
0～4	0.0	0.0	0.0	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5～9	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10～14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0
15～19	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20～24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	19.7	0.0	0.0	0.0
25～29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.2	9.4	0.0	0.0	0.0
30～34	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	7.6	3.8	0.0	0.0	0.0
35～39	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	14.8	8.9	0.0	0.0	0.0
40～44	0.0	5.1	0.0	10.1	5.1	15.2	5.1	0.0	0.0	0.0
45～49	0.0	9.0	0.0	0.0	6.0	23.9	6.0	0.0	0.0	0.0
50～54	3.2	6.4	0.0	0.0	15.9	35.1	0.0	3.2	0.0	0.0
55～59	3.0	12.1	0.0	3.0	12.1	27.3	6.1	0.0	0.0	0.0
60～64	14.8	34.5	0.0	9.9	14.8	41.9	4.9	0.0	0.0	0.0
65～69	6.6	24.3	0.0	11.0	4.4	42.0	4.4	0.0	0.0	0.0
70～74	15.4	20.5	0.0	15.4	25.7	33.4	5.1	0.0	0.0	0.0
75～79	34.1	49.5	0.0	3.1	12.4	34.1	0.0	3.1	0.0	0.0
80～84	16.6	49.7	0.0	29.8	16.6	9.9	0.0	3.3	0.0	0.0
85～	46.0	33.7	0.0	6.1	12.3	15.3	0.0	9.2	0.0	9.2
粗罹患率	8.7	15.6	0.0	7.1	8.0	21.1	4.2	1.1	0.0	0.5
年齢調整罹患率										
S60年モデル人口	2.9	7.0	0.0	4.9	4.6	16.2	5.1	0.4	0.0	0.1
世界人口	2.0	5.1	0.0	5.1	3.5	13.3	4.8	0.3	0.0	0.0

表 主要部位の年齢階級別罹患率・男（H24年）

年齢	その他	原発部位	リンパ組織	リンパ肉腫	ホジキン病	リンパ様・	多発性	白血病	リンパ性	骨髄性
	続発性	不明		細網肉腫		組織球他	骨髄腫		白血病	白血病
	C79	C80	C81~C90, C96	C83, C85	C81	C82, C84, C96	C88, C90	C91~C95	C91	C92
0~4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	14.6	0.0
5~9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10~14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15~19	0.0	0.0	3.9	3.9	0.0	0.0	0.0	3.9	3.9	0.0
20~24	0.0	0.0	8.9	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25~29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.8	4.4	17.4
30~34	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	3.5	0.0	7.0	3.5	3.5
35~39	0.0	0.0	8.4	2.8	2.8	0.0	2.8	8.4	0.0	5.6
40~44	0.0	0.0	14.4	7.2	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0
45~49	0.0	3.0	8.9	5.9	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
50~54	0.0	6.4	35.4	19.3	3.2	12.9	0.0	12.9	0.0	9.6
55~59	0.0	6.4	44.6	31.9	0.0	12.7	0.0	9.6	3.2	3.2
60~64	2.6	13.0	83.4	57.3	0.0	18.2	7.8	20.8	2.6	15.6
65~69	4.7	4.7	44.8	21.2	0.0	14.1	9.4	18.9	0.0	18.9
70~74	0.0	8.9	47.7	20.9	3.0	14.9	8.9	29.8	0.0	23.8
75~79	0.0	12.5	187.9	129.4	4.2	16.7	37.6	45.9	4.2	37.6
80~84	5.4	64.5	182.7	123.6	5.4	5.4	48.4	37.6	0.0	32.2
85~	6.8	47.4	216.6	176.0	0.0	6.8	33.8	20.3	0.0	6.8
粗罹患率	1.0	7.2	42.4	27.5	1.4	7.0	6.6	13.4	1.7	9.7
年齢調整罹患率										
S60年モデル人口	0.4	3.3	22.6	14.0	1.2	4.6	2.7	9.7	2.2	6.3
世界人口	0.3	2.3	16.2	10.0	1.0	3.5	1.7	8.7	2.9	5.0

表 主要部位の年齢階級別罹患率・女（H24年）

年齢	その他	原発部位	リンパ組織	リンパ肉腫	ホジキン病	リンパ様・	多発性	白血病	リンパ性	骨髄性
	続発性	不明		細網肉腫		組織球他	骨髄腫		白血病	白血病
	C79	C80	C81~C90, C96	C83, C85	C81	C82, C84, C96	C88, C90	C91~C95	C91	C92
0~4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5~9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	9.4	4.7
10~14	0.0	0.0	4.2	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15~19	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20~24	0.0	0.0	9.9	4.9	4.9	0.0	0.0	4.9	4.9	0.0
25~29	0.0	0.0	9.4	4.7	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0
30~34	0.0	0.0	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	7.6	3.8	3.8
35~39	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40~44	0.0	0.0	5.1	2.5	0.0	2.5	0.0	2.5	0.0	2.5
45~49	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0
50~54	0.0	6.4	9.6	0.0	0.0	6.4	3.2	0.0	0.0	0.0
55~59	0.0	0.0	33.4	15.2	0.0	3.0	15.2	3.0	0.0	0.0
60~64	0.0	7.4	64.1	27.1	2.5	19.7	14.8	14.8	2.5	12.3
65~69	2.2	2.2	37.6	19.9	0.0	8.8	8.8	6.6	2.2	4.4
70~74	0.0	7.7	66.8	38.5	0.0	7.7	20.5	15.4	5.1	2.6
75~79	3.1	6.2	80.5	40.3	0.0	15.5	24.8	9.3	0.0	6.2
80~84	6.6	13.2	92.7	62.9	3.3	3.3	23.2	19.9	3.3	16.6
85~	9.2	36.8	110.4	67.4	0.0	15.3	27.6	39.9	12.3	24.5
粗罹患率	1.3	4.9	33.7	18.6	0.7	5.6	8.7	8.4	2.5	4.7
年齢調整罹患率										
S60年モデル人口	0.3	1.6	15.5	8.1	0.8	3.0	3.6	4.6	2.0	2.1
世界人口	0.2	1.1	12.0	6.2	0.9	2.4	2.5	4.2	2.1	1.8

表 主要部位の年齢階級別罹患率・男（H24年）

年齢	単球性	その他	形態不明	消化器	呼吸系	皮膚	その他
	白血病	白血病	白血病	上皮内癌	上皮内癌	上皮内癌	上皮内癌
	C93	C94	C95	D00～D01	D02	D03～D04	D09
0～4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5～9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10～14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15～19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20～24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25～29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30～34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35～39	0.0	0.0	2.8	8.4	0.0	0.0	0.0
40～44	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	4.8
45～49	0.0	0.0	0.0	35.7	0.0	0.0	3.0
50～54	3.2	0.0	0.0	32.2	0.0	0.0	6.4
55～59	0.0	3.2	0.0	44.6	0.0	0.0	28.7
60～64	0.0	2.6	0.0	109.4	2.6	0.0	44.3
65～69	0.0	0.0	0.0	68.3	11.8	2.4	37.7
70～74	0.0	3.0	3.0	134.1	0.0	8.9	80.5
75～79	0.0	0.0	4.2	171.2	0.0	25.0	87.7
80～84	0.0	0.0	5.4	134.4	5.4	26.9	129.0
85～	0.0	0.0	13.5	33.8	6.8	33.8	108.3
粗罹患率	0.2	0.6	1.2	44.8	1.5	3.9	26.2
年齢調整罹患率							
S60年モデル人口	0.2	0.4	0.5	25.4	0.7	1.4	12.3
世界人口	0.2	0.3	0.4	18.4	0.5	0.8	8.5

表 主要部位の年齢階級別罹患率・女（H24年）

年齢	単球性	その他	形態不明	消化器	呼吸系	皮膚	子宮頸部	その他
	白血病	白血病	白血病	上皮内癌	上皮内癌	上皮内癌	上皮内癌	上皮内癌
	C93	C94	C95	D00～D01	D02	D03～D04	D06	D09
0～4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5～9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10～14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15～19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20～24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.6	0.0
25～29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	122.1	0.0
30～34	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	121.5	0.0
35～39	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	94.6	0.0
40～44	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	70.9	0.0
45～49	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	65.8	0.0
50～54	0.0	0.0	0.0	22.3	3.2	0.0	22.3	3.2
55～59	3.0	0.0	0.0	36.4	0.0	0.0	6.1	6.1
60～64	0.0	0.0	0.0	27.1	0.0	2.5	19.7	2.5
65～69	0.0	0.0	0.0	39.8	2.2	2.2	4.4	6.6
70～74	0.0	7.7	0.0	53.9	0.0	7.7	5.1	10.3
75～79	0.0	0.0	3.1	46.5	6.2	12.4	0.0	15.5
80～84	0.0	0.0	0.0	39.7	0.0	9.9	0.0	13.2
85～	0.0	0.0	3.1	18.4	0.0	24.5	3.1	6.1
粗罹患率	0.2	0.5	0.4	20.6	0.9	3.6	30.7	4.0
年齢調整罹患率								
S60年モデル人口	0.2	0.2	0.1	11.5	0.7	0.9	41.4	1.7
世界人口	0.1	0.2	0.0	8.5	0.5	0.6	36.1	1.2

10. 市町村別資料（平成24年）

（1）市町村別登録状況

表 市町村別登録状況（平成24年）

市町村	罹患数	死亡数	I/M比	DCO	DCO%
総計	9,433	3,493	2.70	1,201	12.7
新川医療圏	1,093	414	2.64	101	9.2
黒部	352	111	3.17	25	7.1
入善	220	106	2.08	31	14.1
朝日	104	52	2.00	18	17.3
魚津	417	145	2.88	27	6.5
富山医療圏	4,082	1,508	2.71	532	13.0
滑川	272	114	2.39	56	20.6
舟橋	17	1	17.00	0	0.0
上市	209	74	2.82	24	11.5
立山	239	92	2.60	28	11.7
富山	3,345	1,227	2.73	424	12.7
高岡医療圏	3,061	1,121	2.73	351	11.5
射水	817	299	2.73	85	10.4
高岡	1,750	619	2.83	202	11.5
氷見	494	203	2.43	64	13.0
砺波医療圏	1,197	450	2.66	217	18.1
砺波	442	140	3.16	61	13.8
南砺	505	196	2.58	102	20.2
小矢部	250	114	2.19	54	21.6

注)

I：がん罹患数

M：がんによる死亡数

I/M比：がん罹患数とがん死亡数との比

DCO：死亡情報のみで登録されたがん患者数

DCO%：がん死亡情報で初めて把握されたがん患者の割合

(2) 市町村別罹患数

表 市町村別罹患数・男（H24年）

市町村	全部位	口腔咽頭	口唇	舌	大唾液腺	歯肉	口腔底	その他	中咽頭	鼻（上）
	C00～C96							口腔		咽頭
	D00～D09	C00～C14	C00	C01～C02	C07～C08	C03	C04	C05～C06	C09～C10	C11
総計	5,378	93	2	21	6	8	3	4	12	6
新川医療圏	632	12	0	5	1	0	0	0	2	0
黒部	205	5	0	1	1	0	0	0	0	0
入善	126	3	0	3	0	0	0	0	0	0
朝日	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
魚津	235	4	0	1	0	0	0	0	2	0
富山医療圏	2,259	39	1	10	1	4	1	2	3	5
滑川	147	3	0	1	0	1	0	0	0	0
舟橋	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上市	126	1	0	0	0	0	0	0	0	0
立山	122	1	0	0	0	1	0	0	0	0
富山	1,859	34	1	9	1	2	1	2	3	5
高岡医療圏	1,807	36	0	6	4	4	1	2	7	1
射水	490	9	0	2	2	0	1	0	2	1
高岡	1,036	21	0	3	2	3	0	1	4	0
氷見	281	6	0	1	0	1	0	1	1	0
砺波医療圏	680	6	1	0	0	0	1	0	0	0
砺波	246	2	0	0	0	0	1	0	0	0
南砺	295	1	1	0	0	0	0	0	0	0
小矢部	139	3	0	0	0	0	0	0	0	0

表 市町村別罹患数・女（H24年）

市町村	全部位	口腔咽頭	口唇	舌	大唾液腺	歯肉	口腔底	その他	中咽頭	鼻（上）
	C00～C96							口腔		咽頭
	D00～D09	C00～C14	C00	C01～C02	C07～C08	C03	C04	C05～C06	C09～C10	C11
総計	4,055	54	0	14	3	18	2	4	5	2
新川医療圏	461	7	0	3	0	2	1	0	0	0
黒部	147	2	0	0	0	1	0	0	0	0
入善	94	3	0	3	0	0	0	0	0	0
朝日	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
魚津	182	2	0	0	0	1	1	0	0	0
富山医療圏	1,823	23	0	4	3	9	1	1	1	1
滑川	125	1	0	0	0	0	1	0	0	0
舟橋	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上市	83	1	0	1	0	0	0	0	0	0
立山	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
富山	1,486	21	0	3	3	9	0	1	1	1
高岡医療圏	1,254	16	0	4	0	6	0	3	1	1
射水	327	6	0	2	0	4	0	0	0	0
高岡	714	8	0	2	0	2	0	2	1	1
氷見	213	2	0	0	0	0	0	1	0	0
砺波医療圏	517	8	0	3	0	1	0	0	3	0
砺波	196	1	0	0	0	0	0	0	0	0
南砺	210	4	0	0	0	1	0	0	3	0
小矢部	111	3	0	3	0	0	0	0	0	0

表 市町村別罹患数・男（H24年）

市町村	下咽頭	部位不明	食道	胃	小腸	結腸	直腸・	肝・	胆嚢・	膵
	C12～C13	口腔	C15	C16	C17	C18	肛門	肝内胆管	肝外胆管	C25
		C14					C19～C21	C22	C23～C24	
総計	23	8	171	1,055	24	451	266	263	141	212
新川医療圏	3	1	17	113	3	60	23	35	17	21
黒部	2	1	7	34	2	18	6	9	7	4
入善	0	0	4	22	1	13	6	8	5	5
朝日	0	0	2	12	0	6	3	7	1	0
魚津	1	0	4	45	0	23	8	11	4	12
富山医療圏	9	3	70	454	11	209	134	100	52	106
滑川	1	0	5	30	0	14	6	7	3	8
舟橋	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0
上市	1	0	2	23	2	14	13	3	3	7
立山	0	0	3	29	1	12	5	3	2	10
富山	7	3	60	368	8	168	110	87	44	81
高岡医療圏	9	2	65	347	9	127	79	86	42	68
射水	1	0	12	89	1	35	26	34	15	21
高岡	6	2	46	205	7	69	45	47	14	36
氷見	2	0	7	53	1	23	8	5	13	11
砺波医療圏	2	2	19	141	1	55	30	42	30	17
砺波	1	0	1	45	0	15	4	17	20	7
南砺	0	0	11	71	0	25	15	15	8	7
小矢部	1	2	7	25	1	15	11	10	2	3

表 市町村別罹患数・女（H24年）

市町村	下咽頭	部位不明	食道	胃	小腸	結腸	直腸・	肝・	胆嚢・	膵
	C12～C13	口腔	C15	C16	C17	C18	肛門	肝内胆管	肝外胆管	C25
		C14					C19～C21	C22	C23～C24	
総計	6	0	30	530	7	400	165	129	152	157
新川医療圏	1	0	4	55	0	54	19	10	23	18
黒部	1	0	0	15	0	10	6	3	6	5
入善	0	0	0	11	0	17	2	3	6	3
朝日	0	0	0	4	0	5	2	1	3	2
魚津	0	0	4	25	0	22	9	3	8	8
富山医療圏	3	0	11	239	5	179	68	55	52	66
滑川	0	0	1	17	0	16	2	8	1	6
舟橋	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0
上市	0	0	0	12	0	4	1	3	4	2
立山	0	0	0	21	0	7	4	6	3	4
富山	3	0	10	188	5	150	61	38	44	54
高岡医療圏	1	0	10	162	2	108	60	44	57	49
射水	0	0	1	37	0	25	22	14	11	10
高岡	0	0	8	94	1	61	35	24	34	29
氷見	1	0	1	31	1	22	3	6	12	10
砺波医療圏	1	0	5	74	0	59	18	20	20	24
砺波	1	0	1	23	0	19	8	6	5	10
南砺	0	0	2	34	0	23	5	11	13	10
小矢部	0	0	2	17	0	17	5	3	2	4

表 市町村別罹患数・男（H24年）

市町村	後腹膜・	部位不明	鼻腔・中耳	喉頭	気管支・	胸膜	胸腺・心	部位不明	骨・	結合組織
	腹膜	消化器	副鼻腔		肺		縦隔・胸膜	胸腔内臓器	関節軟骨	軟部組織
	C48	C26	C30~C31	C32	C33~C34	C45	C37~C38	C39	C40~C41	C47, C49
総計	4	2	11	51	739	9	12	0	7	14
新川医療圏	0	0	1	6	100	1	2	0	2	1
黒部	0	0	1	1	31	1	0	0	1	1
入善	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0
朝日	0	0	0	1	9	0	0	0	0	0
魚津	0	0	0	4	34	0	2	0	1	0
富山医療圏	0	1	6	17	283	5	4	0	2	3
滑川	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0
舟橋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上市	0	1	0	1	18	0	0	0	0	0
立山	0	0	1	0	14	1	0	0	0	1
富山	0	0	5	16	239	4	4	0	2	2
高岡医療圏	3	1	3	17	263	3	6	0	3	9
射水	0	1	2	5	75	1	1	0	1	3
高岡	3	0	1	9	146	1	4	0	1	6
氷見	0	0	0	3	42	1	1	0	1	0
砺波医療圏	1	0	1	11	93	0	0	0	0	1
砺波	0	0	0	7	35	0	0	0	0	0
南砺	0	0	1	3	41	0	0	0	0	1
小矢部	1	0	0	1	17	0	0	0	0	0

表 市町村別罹患数・女（H24年）

市町村	後腹膜・	部位不明	鼻腔・中耳	喉頭	気管支・	胸膜	胸腺・心	部位不明	骨・	結合組織
	腹膜	消化器	副鼻腔		肺		縦隔・胸膜	胸腔内臓器	関節軟骨	軟部組織
	C48	C26	C30~C31	C32	C33~C34	C45	C37~C38	C39	C40~C41	C47, C49
総計	8	1	6	2	343	3	4	0	8	8
新川医療圏	1	0	1	1	53	0	1	0	3	1
黒部	0	0	0	1	21	0	1	0	0	0
入善	0	0	1	0	9	0	0	0	1	1
朝日	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
魚津	1	0	0	0	20	0	0	0	2	0
富山医療圏	3	0	2	1	127	1	0	0	4	3
滑川	0	0	1	0	6	0	0	0	1	0
舟橋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上市	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
立山	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
富山	3	0	1	1	105	1	0	0	3	3
高岡医療圏	1	0	3	0	109	2	3	0	1	4
射水	0	0	2	0	28	0	0	0	0	1
高岡	1	0	1	0	65	0	1	0	1	2
氷見	0	0	0	0	16	2	2	0	0	1
砺波医療圏	3	1	0	0	54	0	0	0	0	0
砺波	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
南砺	2	1	0	0	17	0	0	0	0	0
小矢部	1	0	0	0	13	0	0	0	0	0

表 市町村別罹患数・男（H24年）

市町村	悪性	その他	乳房	前立腺	睾丸	陰茎
	黒色腫 C43	皮膚 C44, C46	(上皮内含む) C50, D05	C61	C62	その他男性性器 C60, C63
総計	4	57	7	531	17	7
新川医療圏	0	8	1	76	1	2
黒部	0	3	0	23	1	1
入善	0	1	1	11	0	0
朝日	0	1	0	5	0	0
魚津	0	3	0	37	0	1
富山医療圏	3	32	2	198	5	3
滑川	0	3	0	21	1	2
舟橋	0	0	0	0	0	0
上市	0	3	0	9	0	0
立山	1	1	0	9	0	0
富山	2	25	2	159	4	1
高岡医療圏	1	16	1	200	7	1
射水	0	4	0	45	0	1
高岡	1	10	1	116	7	0
氷見	0	2	0	39	0	0
砺波医療圏	0	1	3	57	4	1
砺波	0	0	3	16	3	1
南砺	0	1	0	31	0	0
小矢部	0	0	0	10	1	0

表 市町村別罹患数・女（H24年）

市町村	悪性	その他	乳房	子宮	子宮	子宮頸部	胎盤	子宮体部	卵巣	外陰・膣
	黒色腫 C43	皮膚 C44, C46	(上皮内含む) C50, D05	C53~55, C58	部位不明 C55	C53	C58	C54	C56~C57	その他女性性器 C51, C52
総計	7	52	667	203	6	62	0	135	102	13
新川医療圏	0	5	88	21	2	6	0	13	7	1
黒部	0	3	37	9	1	1	0	7	2	1
入善	0	1	17	5	0	1	0	4	2	0
朝日	0	0	7	1	1	0	0	0	0	0
魚津	0	1	27	6	0	4	0	2	3	0
富山医療圏	5	21	316	93	3	27	0	63	48	5
滑川	0	0	20	7	1	0	0	6	3	0
舟橋	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0
上市	1	1	19	4	0	3	0	1	2	0
立山	1	2	14	9	0	3	0	6	3	0
富山	3	18	261	72	2	21	0	49	39	5
高岡医療圏	2	17	190	66	1	26	0	39	35	2
射水	1	4	65	20	1	6	0	13	7	1
高岡	1	7	89	30	0	13	0	17	23	1
氷見	0	6	36	16	0	7	0	9	5	0
砺波医療圏	0	9	73	23	0	3	0	20	12	5
砺波	0	0	30	9	0	3	0	6	4	2
南砺	0	5	28	9	0	0	0	9	6	3
小矢部	0	4	15	5	0	0	0	5	2	0

表 市町村別罹患数・男（H24年）

市町村	膀胱	腎・尿管	眼・ 付属器	脳	髄膜・ その他神経系	甲状腺	副腎・ その他内分泌腺	その他 部位不明確	リンパ節 続発性	呼吸消化器 続発性
	C67	C64～C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74～C75	C76	C77	C78
総計	154	157	2	48	16	40	13	0	0	6
新川医療圏	30	17	0	10	2	4	1	0	0	0
黒部	13	5	0	5	0	2	0	0	0	0
入善	6	4	0	2	0	0	0	0	0	0
朝日	3	2	0	0	1	2	1	0	0	0
魚津	8	6	0	3	1	0	0	0	0	0
富山医療圏	61	58	2	14	10	17	10	0	0	3
滑川	5	3	0	1	0	0	2	0	0	0
舟橋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上市	4	3	0	0	1	0	0	0	0	0
立山	1	1	0	1	0	1	3	0	0	0
富山	51	51	2	12	9	16	5	0	0	3
高岡医療圏	50	62	0	18	2	17	2	0	0	2
射水	16	17	0	6	0	2	1	0	0	0
高岡	25	39	0	11	2	11	1	0	0	1
氷見	9	6	0	1	0	4	0	0	0	1
砺波医療圏	13	20	0	6	2	2	0	0	0	1
砺波	6	8	0	3	1	0	0	0	0	1
南砺	7	10	0	3	0	1	0	0	0	0
小矢部	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0

表 市町村別罹患数・女（H24年）

市町村	膀胱	腎・尿管	眼・ 付属器	脳	髄膜・ その他神経系	甲状腺	副腎・ その他内分泌腺	その他 部位不明確	リンパ節 続発性	呼吸消化器 続発性
	C67	C64～C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74～C75	C76	C77	C78
総計	49	86	0	41	45	119	23	6	0	3
新川医療圏	7	11	0	4	1	16	2	0	0	0
黒部	1	3	0	2	0	7	0	0	0	0
入善	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0
朝日	0	2	0	0	0	2	1	0	0	0
魚津	5	4	0	2	1	6	1	0	0	0
富山医療圏	20	34	0	22	23	64	16	1	0	2
滑川	3	2	0	2	1	7	0	0	0	0
舟橋	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
上市	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0
立山	1	5	0	2	3	4	0	1	0	0
富山	16	26	0	16	19	51	16	0	0	2
高岡医療圏	20	33	0	13	19	33	5	4	0	1
射水	3	5	0	3	6	9	1	1	0	0
高岡	14	22	0	7	11	22	2	3	0	0
氷見	3	6	0	3	2	2	2	0	0	1
砺波医療圏	2	8	0	2	2	6	0	1	0	0
砺波	0	2	0	0	1	5	0	0	0	0
南砺	2	3	0	2	0	1	0	0	0	0
小矢部	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0

表 市町村別罹患数・男（H24年）

市町村	その他	原発部位	リンパ組織	リンパ肉腫	ホジキン病	リンパ様・	多発性	白血病	リンパ性	骨髄性
	続発性	不明		細網肉腫		組織球他	骨髄腫		白血病	白血病
	C79	C80	C81～C90, C96	C83, C85	C81	C82, C84, C96	C88, C90	C91～C95	C91	C92
総計	5	39	228	146	8	38	36	74	9	55
新川医療圏	1	5	21	12	1	5	3	8	1	6
黒部	1	1	6	3	0	2	1	2	0	2
入善	0	1	4	2	0	1	1	0	0	0
朝日	0	1	2	2	0	0	0	3	1	1
魚津	0	2	9	5	1	2	1	3	0	3
富山医療圏	1	13	93	59	4	12	18	28	5	20
滑川	0	1	4	3	0	0	1	5	1	3
舟橋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上市	0	1	7	4	0	2	1	3	0	2
立山	1	2	10	6	0	1	3	2	1	0
富山	0	9	72	46	4	9	13	18	3	15
高岡医療圏	3	13	82	53	3	16	10	30	3	23
射水	3	3	20	11	0	6	3	8	2	3
高岡	0	5	51	34	3	7	7	17	1	16
氷見	0	5	11	8	0	3	0	5	0	4
砺波医療圏	0	8	32	22	0	5	5	8	0	6
砺波	0	3	9	3	0	4	2	3	0	2
南砺	0	4	13	10	0	1	2	2	0	2
小矢部	0	1	10	9	0	0	1	3	0	2

表 市町村別罹患数・女（H24年）

市町村	その他	原発部位	リンパ組織	リンパ肉腫	ホジキン病	リンパ様・	多発性	白血病	リンパ性	骨髄性
	続発性	不明		細網肉腫		組織球他	骨髄腫		白血病	白血病
	C79	C80	C81～C90, C96	C83, C85	C81	C82, C84, C96	C88, C90	C91～C95	C91	C92
総計	7	28	189	106	4	31	48	46	14	26
新川医療圏	0	3	17	7	0	5	5	8	2	4
黒部	0	2	6	3	0	2	1	1	0	1
入善	0	1	2	1	0	0	1	2	1	1
朝日	0	0	4	1	0	1	2	0	0	0
魚津	0	0	5	2	0	2	1	5	1	2
富山医療圏	4	11	94	57	2	14	21	23	8	13
滑川	0	1	7	7	0	0	0	2	1	1
舟橋	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
上市	0	0	7	3	1	1	2	0	0	0
立山	0	1	6	5	0	0	1	2	0	2
富山	4	9	73	41	1	13	18	19	7	10
高岡医療圏	2	7	56	31	1	11	13	11	3	7
射水	1	4	13	6	1	3	3	5	2	2
高岡	1	3	36	21	0	7	8	3	0	3
氷見	0	0	7	4	0	1	2	3	1	2
砺波医療圏	1	7	22	11	1	1	9	4	1	2
砺波	1	5	9	5	0	0	4	1	0	1
南砺	0	1	6	3	1	0	2	3	1	1
小矢部	0	1	7	3	0	1	3	0	0	0

表 市町村別罹患数・男（H24年）

市町村	単球性	その他	形態不明	消化器	呼吸系	皮膚	その他
	白血病	白血病	白血病	上皮内癌	上皮内癌	上皮内癌	上皮内癌
	C93	C94	C95	D00～D01	D02	D03～D04	D07, 09
総計	1	3	6	231	8	20	134
新川医療圏	0	0	1	12	0	2	15
黒部	0	0	0	4	0	1	8
入善	0	0	0	2	0	0	1
朝日	0	0	1	3	0	0	1
魚津	0	0	0	3	0	1	5
富山医療圏	1	2	0	134	7	6	39
滑川	0	1	0	4	2	0	2
舟橋	0	0	0	0	0	0	0
上市	1	0	0	4	0	0	2
立山	0	1	0	3	0	0	3
富山	0	0	0	123	5	6	32
高岡医療圏	0	1	3	55	0	8	49
射水	0	1	2	14	0	3	13
高岡	0	0	0	35	0	3	25
氷見	0	0	1	6	0	2	11
砺波医療圏	0	0	2	30	1	4	31
砺波	0	0	1	19	0	0	14
南砺	0	0	0	8	0	3	11
小矢部	0	0	1	3	1	1	6

表 市町村別罹患数・女（H24年）

市町村	単球性	その他	形態不明	消化器	呼吸系	皮膚	子宮頸部	その他
	白血病	白血病	白血病	上皮内癌	上皮内癌	上皮内癌	上皮内癌	上皮内癌
	C93	C94	C95	D00～D01	D02	D03～D04	D06	D07, 09
総計	1	3	2	113	5	20	169	22
新川医療圏	0	1	1	1	0	0	14	2
黒部	0	0	0	1	0	0	0	2
入善	0	0	0	0	0	0	3	0
朝日	0	0	0	0	0	0	0	0
魚津	0	1	1	0	0	0	11	0
富山医療圏	0	2	0	61	4	4	83	10
滑川	0	0	0	1	1	0	5	1
舟橋	0	0	0	0	1	0	2	0
上市	0	0	0	4	0	0	3	0
立山	0	0	0	6	0	2	2	1
富山	0	2	0	50	2	2	71	8
高岡医療圏	1	0	0	33	1	10	48	5
射水	1	0	0	4	0	1	14	2
高岡	0	0	0	23	1	9	32	3
氷見	0	0	0	6	0	0	2	0
砺波医療圏	0	0	1	18	0	6	24	5
砺波	0	0	0	12	0	2	13	2
南砺	0	0	1	4	0	3	10	2
小矢部	0	0	0	2	0	1	1	1