

富富富 特報

1. JAみな穂管内の生育状況(6/4現在)

本年産は、平年に比べ、草丈は同程度、莖数は少なく、葉色はやや淡くなっています。

	田植日	草丈(cm)	莖数(本/株)	莖数(本/m ²)	葉令	葉色
R6	5/14	25.8	7.0	145.9	5.6	4.0
R5	5/14	27.9	8.3	176.1	5.9	4.2
平年	5/14	25.4	9.9	201.5	6.0	4.2

※展示ほ場数(4ヶ所)

2. 今後の管理

中干しまでの水管理として、水深2~3cmの浅水管理を徹底し、分げつの発生を促進しましょう。また、田がわいている場合は軽い田干しを、藻が発生している場合は水の入れ替えを行いましょう。

田植後1か月頃から止水・落水し、適度な土壌硬度を確保した上で、溝掘りを行い、そのまま中干しに入りましょう。

中干し後の水管理は、「富富富」は葉色が濃く推移するため、幼穂形成期まで落水期間が長めの間断かん水を行いましょう。

<水管理のイメージ>



【中干し】



3. 中・後期除草剤の散布(12成分以内)

富富富の流通基準で、病虫害・雑草防除に使用する化学合成農薬の成分は『合計12以内』と定められているため、中・後期除草剤は極力使用しないでください。ただし、中干し後に雑草の発生が多い場合は、草種と葉齢に合わせて、除草剤を散布しましょう。使用する際には、振興センター又は営農指導員に相談してください。

対象雑草	農薬名	散布時期	10a当たり散布量	成分数	使用回数
ノビエ	トドメMF1キログラム粒剤 (湛水して散布)	田植後14日 ~ノビエ5葉期 (収穫50日前まで)	1kg	1	3回以内
ノビエ 広葉雑草	フォローアップ 1キログラム粒剤 (湛水して散布)	田植後15日 ~ノビエ5葉期 (イネ4葉期以降) (収穫60日前まで)	1kg	2	1回
広葉雑草	バサグラン粒剤 (落水して散布)	田植後15~55日 (収穫60日前まで)	3~4kg	1	1回

【12成分以内の事例】

※下記の事例は合計10成分となり、残り2成分使えます。

作業	種子消毒	苗箱施薬	除草剤		本田防除	
剤名	テグリードC フロアブル	フェルテラ 箱粒剤	かねつぐ 1kg粒剤	プライオリティ 1kg粒剤	スタークル液剤10 + モンカットフロアブル	ラブサイドK2 フロアブル
成分	1	1	2	2	2	2