

# 富富富 特報

まもなく、「富富富」の刈取り時期を迎えます。  
「胴割米」の発生を防ぐため、適期刈取りと適正な乾燥  
調製を行い、「富富富」ブランドの確立を図りましょう！



## 1. 刈取りまでの水管理

～落水を急がないように！～

- ・刈取りの5～7日前まで間断かん水を行い、稲体の活力を維持し胴割米の発生を防ぎましょう。なお、フェーン現象が予想される場合は、胴割粒の発生等防ぐために、事前に入水しましょう。

## 2. 適期刈取り

～籾黄化率を確認して、適期に刈取る！～

- ・青米や胴割米の混入を防ぐため、籾の黄化率 80%を目安に刈取りを始め、黄化率 90%までに刈り終えましょう。
- ・コシヒカリに比べ、籾の黄化にバラツキが出やすく、また、急激に黄化するため、注意が必要です。

籾黄化率 90%を超えると、胴割米が急激に多くなるので注意しましょう。

### 【刈取り開始時期の目安】

出穂期	刈取適期
8月4日	9月16日～9月17日頃
8月7日	9月19日～9月20日頃
8月10日	9月23日～9月24日頃

- ・刈取り作業は計画的に行い、籾の黄化の進んだものから遅れずに刈取りを開始し、胴割米の発生を防止しましょう。



籾黄化率 80%

## 3. 乾燥・調製

～「過乾燥」による胴割米の発生防止～

- ・乾燥速度は毎時 0.8%以内を基本とし、ゆっくりと乾燥しましょう。
- ・初期の籾水分が高い場合（25%以上）や低い場合（20%以下）は、毎時 0.6%以内とし、二段乾燥や送風温度を下げるなど、ていねいな乾燥に努めてください。
- ・青米の混入が多いので、水分の戻りに注意して停止水分を設定しましょう。

### 【乾燥機停止水分の目安】

100粒中の青米粒数	0～5粒	6～10粒	11粒以上
乾燥機停止後の水分変化	乾く(-0.5%)	変わらない	もどる(+0.5%以上)

- ・玄米水分は 14.5～15.0%に仕上げましょう。玄米水分が 17%以下になったら、手動水分計でこまめに測定し、過乾燥米の発生を防止しましょう。

**※フレコン出荷の場合は、14.1～14.5%に仕上げてください。**

- ・1.9mmのふるい目による選別を徹底し、未熟粒の混入を防ぎましょう。色彩選別機を整備している経営体は、積極的に活用し、品質の向上に努めましょう。